

[DUE form] ใบประกอบการสั่งจ่าย Antibiotic Drugs โรงพยาบาลแม่สรวย

ชื่อ - สกุลผู้ป่วย _____

HN _____

อายุ _____

ปี น้ำหนัก _____

กิโลกรัม

[IV] Amoxicillin-Clavulanate K 1.2 gm inj ↓

Empiric Therapy เฉพาะในข้อบ่งชี้ ต่อไปนี้

- Obstructive pneumonitis Aspirate pneumonia
 Cellulitis in immunocompromised host Abscess

Document Therapy - Source of infection _____

ใช้กรณีที่ผล culture and sensitivity ใดต่อยานี้

อื่น ๆ (ระบุ) _____

Normal dose: 1.2 g IV q 6 - 8 hr

CrCl > 30: ไม่ปรับขนาดยา

CrCl 10 - 30: 1.2 g IV STAT followed by 600 mg IV q 12 hr

CrCl < 10: 1.2 g IV STAT followed by 600 mg IV q 24 hr

- Hemodialysis ให้บริหารยาหลังจากทำ HD ของวันนั้น หรือเพิ่มยา additional dose 600 mg IV หลังฟอกไต
- CAPD สามารถบริหาร IV ตามรอบปกติของการให้ยาได้เลย

CEFOtaxime 1 gm inj

พิจารณาใช้ยาเฉพาะผู้ป่วยเด็ก หรือเด็กอายุ < 29 วัน

BACTERIAL SEPSIS URINARY TRACT INFECTION

LOWER RESPIRATORY TRACT INFECTION

อื่น ๆ (ระบุ) _____

NEONATES - พิจารณาจากอายุและน้ำหนักตัว

0 - 4 weeks	< 1200 gm	50 mg/kg IV q 12 hr
< 1 week	1200 - 2000 gm	50 mg/kg IV q 12 hr
	> 2000 gm	50 mg/kg IV q 8 - 12 hr
> 1 week	1200 - 2000 gm	50 mg/kg IV q 8 hr
	> 2000 gm	50 mg/kg IV q 6 - 8 hr

INFANTS AND CHILDREN (อายุมากกว่า 1 เดือน)

Mild to moderate infection	75 - 100 mg/kg/day IV/IM แบ่งให้ วันละ 3 - 4 ครั้ง, MAX 4 to 6 g/day
Severe infection	150 - 200 mg/kg/day IV/IM แบ่งให้ วันละ 3 - 4 ครั้ง, MAX 8 to 10 g/day

** CrCl < 20 mL/min: ลดขนาดยา by 50% **

**Amoxicillin/Clavulanate K 875/125 mg (tablet)
Amoxicillin/Clavulanate K 200/28.51 mg/5 ml (syrup)**

OTITIS MEDIA:

Amoxicillin 80 - 90 mg/kg/day q 12 hr (Max 4 g/day)

BITE WOUND INFECTION, (animal or human bite)

- Adult: Amoxicillin 875 mg q 12 hr
- อายุ > 28 วัน: Amoxicillin 22.5 mg/kg q 12 hr (Max 875 mg amoxicillin/dose)

สำหรับป้องกันการติดเชื้อให้นาน 3 - 5 วัน, รักษาการติดเชื้อให้นาน 5 - 14 วัน

อื่น ๆ (ระบุ) _____

CrCl > 30: ไม่ปรับขนาดยา

CrCl 10-30: 250 - 500 mg q 12 hr

CrCl < 10: 250 - 500 mg q 24 hr

- Hemodialysis: 250 - 500 mg q 12 - 24 hr ให้ยาหลัง HD หรือเพิ่ม additional dose หลังฟอก
- CAPD: 250 - 500 mg q 12 hr

หลังจากกรอกแบบฟอร์มนี้เรียบร้อยแล้ว

กรุณานำส่งคืนฝ่ายเภสัชกรรมฯ ขอขอบคุณครับ/ค่ะ

FM - PHAR - 38 (Updated 2023 - 01 - 38)

CefixIME 100 mg/capsule ⊖

Empiric Therapy: IV ceftriaxone to PO Conversion

ระบุ indication _____

Document Therapy

- Pharyngitis Sinusitis Meningitis
 Urinary tract infection Enteric fever

อื่น ๆ (ระบุ) _____

ADULT	อายุ 6 เดือน - 12 ปี, BW < 45 kg
Normal dose: 200 mg BID	Normal dose: 8 mg/kg OD หรือ 4 mg/kg q 12 hr
CrCl ≥60: ไม่ปรับขนาดยา	CrCl ≥21: ไม่ปรับขนาดยา
CrCl 21 - 59: 300 mg OD	CrCl <20: 4 mg/kg OD
CrCl ≤20: 200 mg OD	Anuric: 4 mg/kg OD
Hemodialysis: 300 mg OD	
CAPD: 200 mg OD	

Azithromycin 250 mg/capsule

Scrub typhus ในหญิงตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

การติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ ในกรณีที่ใช้ยาอื่นไม่ได้หรือไม่ได้ผล

ระบุยาที่เคยใช้ _____

อื่น ๆ (ระบุ) _____

Normal dose:

Adult: 500 mg DAY 1, followed by 250 mg DAY 2 - 5

อายุ >3 เดือน: 10 mg/kg DAY 1, followed by 5 mg/kg DAY 2 - 5

แพทย์ผู้สั่งจ่าย _____

วัน/เดือน/ปี _____

สำหรับเภสัชกร

สมเหตุสมผล

ไม่สมเหตุสมผล